

1913

Stoffwechsel-Versuche bei Herabsetzung des Sauerstoff-Partialdruckes in der Respirationsluft.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde in der Medizin und Chirurgie

mit Genehmigung der hohen Medizinischen Fakultät

der

Vereinigten Friedrichs-Universität
Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Martin Bache

Assistenzarzt am Salvator Krankenhaus zu Halberstadt
aus ~~Kottbus.~~



Halle a. S.

Hof-Buch- und Steindruckerei von C. A. Kaemmerer & Co.

1913.

Gedruckt mit Genehmigung
der medizinischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg.

Referent: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Ad. Schmidt.

Veit
z. Z. Dekan.

Meinen lieben Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Bereits Paul Bert (1)¹⁾ fiel bei seinen immerhin nicht einwandfreien Versuchen an Ratten und Hunden ein wesentlicher Einfluß von verdünnter und verdichteter Luft auf den Stoffwechsel auf. Er fand bei seinen Versuchen an Hunden in der pneumatischen Kammer bei einem 3 Atmosphären nicht übersteigenden Druck eine vermehrte Harnstoffausscheidung, während er bei Erniedrigung des Atmosphärendruckes eine beträchtliche Verminderung des Harnstoffes bis zu 50 % beobachtete. (Siehe La Pression barometrique pag. 729). Man muß jedoch bei diesem Ergebnis berücksichtigen, daß die Versuchsanordnung eine unzulängliche war, weil die Versuchstiere sich nicht im Stickstoffgleichgewicht befanden. Im Gegensatz hierzu fand A. Fraenkel (2) bei einem Versuch am Hund, daß Aufenthalt in verdichteter Luft bis zum Überdruck von 1 Atmosphäre keine Einwirkung auf die Größe des Eiweißumsatzes ausübt, daß dagegen Erniedrigung des Luftdruckes bis auf $\frac{1}{2}$ Atmosphäre eine mäßige, aber deutlich erkennbare Steigerung des Eiweißumsatzes bewirkt. Und weiter hat A. Fraenkel, zusammen mit J. Geppert (2), nachgewiesen, daß bei Atmung in verdünnter Luft

1. an den Versuchstagen die N-Ausscheidung nie erhöht, einigemale sogar vermindert war,

1) Die hinter den Autoren befindlichen Zahlen verweisen auf das Literaturverzeichnis am Schluß.

2. daß an den auf die Versuchstage folgenden 2 Tagen ausnahmslos im Harn mehr N ausgeschieden wurde, als an irgend einem der übrigen Tage, und
3. daß die mittlere Ausscheidungsgröße der Versuchstage und der ihnen folgenden Tage im Vergleich zu derjenigen der vorausgegangenen Normaltage eine konstante Mehrausgabe von N im Harn ergibt.

Nach ihrer Berechnung betrug die Steigerung der N-Abgabe durch den Harn bei siebenstündigem Aufenthalt in einer Luft von durchschnittlich 23 H g-Druck 9,48 g N. Sie kommen also zu dem Schluß, daß die Verringerung des Sauerstoffpartialdruckes der Atmungsluft von Einfluß auf den Umfang der Oxydationsprozesse, und somit des ganzen Stoffwechsels ist. Das steht entgegen der von Voit (3) vertretenen Anschauung, daß dem Sauerstoffgehalt der Atemluft kein wesentlicher Einfluß auf den tierischen Stoffwechsel zukomme.

Ferner haben Reale und Boeri (4) bei Hunden durch Anlegung eines Gipskorsetts künstliche Atmungsbeschwerden hervorgerufen. Dabei entstand eine bedeutende Zunahme von Oxalsäure im Harn, wahrscheinlich weil die Lungen den Körper nicht mehr genügend mit O_2 versorgen konnten. Dasselbe erreichte auf einer etwas anderen Art und Weise Terray (4). Die Ergebnisse dieser Versuche nun stimmten im allgemeinen darin überein, daß die Versuchstiere bei verändertem Sauerstoffgehalt der Atmungsluft und bei verändertem Atmosphärendruck einen Albumenabbau zeigen, sei es bereits während der Versuchstage oder erst an den den Versuchstagen folgenden Tagen.

Theoretisch ähnelt den Versuchen in der pneumatischen Kammer der Aufenthalt in Höhenluft; gemeinsam ist

beiden die Druckveränderung der Atmungsluft und die dadurch bedingte Veränderung des Sauerstoffpartialdruckes. Andererseits bestehen aber auch beträchtliche Differenzen, die von bedeutsamem Einfluß auf den Stoffwechsel sein können. Man denke an die veränderten klimatischen Verhältnisse, wie Wind, Licht, Wärme usw. Auch die veränderte Muskeltätigkeit muß man berücksichtigen; doch scheint dieser Einfluß nicht sehr bedeutend zu sein. Schon Voit (3) fand, daß die N-Ausscheidung durch mäßige Muskeltätigkeit nicht oder wenigstens nur mäßig beeinflußt werde. Oppenheim (13) konnte dies durch einen Versuch bestätigen. Er fand nämlich, nachdem er seinen Körper in N-Gleichgewicht gebracht hatte und nachdem er den Kreuzberg (bei Bonn) mehrere Male an einigen Tagen langsam und an anderen schnell bestiegen hatte, bis Dyspnoe eintrat, daß an den ersten Versuchstagen die Harnstoffausscheidung keine wesentliche Änderung aufwies, während sie an den letzten Versuchstagen beträchtlich vermehrt war.

Ferner behauptet Mosso (6), fußend auf seinen Beobachtungen und Versuchen an zwei Soldaten nach Besteigen der Margaritha-Hütte, daß, wenn die Quantität des Sauerstoffes in der Luft abnehme, der Mensch nicht imstande sei, das Stoffwechselgleichgewicht seines Körpers zu wechseln und die Substanz der Organe wenig verbrennen zu lassen. Auch in der verdünnten Luft fordere der Organismus sein bestimmtes Quantum an Sauerstoff.

Von Stoffwechselversuchen im Hochgebirge wäre zunächst Guglieminette (5) zu erwähnen, der bei einem Aufstieg auf den Montblanc 8—10‰ Harnstoff im Urin fand. Ferner beobachtete Kronecker (5) bei Versuchen an geübten und ungeübten Bergwanderern, indem er den sogleich nach

dem Abstieg gelassenen Urin mit dem nach langer Ruhe entleerten verglich, daß angestrengte Bergsteiger in einen krankhaften Zustand geraten, der sich objektiv darin äußere, daß die N-Ausscheidung im Arbeitsurin geringer war, im Vergleich zu der nach längerer Ruhe entleerten Menge Urin.

Bei ihrer eingehenden Arbeit über „Stoffwechselversuche im Hochgebirge“ fanden Jaquet und Staehelin (7) zunächst bei Übersiedelung von der Ebene ins Gebirge eine Zunahme der Urinsekretion beim Gebirgsaufenthalt, die beim Aufenthalt in der Ebene sofort schwand. Sie verglichen die Ausscheidungen in Basel (Ebene) und die auf dem Chasseral. Für die Schwankungen in der Urinmenge geben sie als Grund den Temperaturunterschied an.

Betreffs des Harnstickstoffs nun stellten sie fest, daß zunächst beim Aufstieg auf den Chasseral eine vermehrte N-Ausscheidung bis zu 2 g auftrat, die auch am zweiten Tage des Aufenthalts auf dem Chasseral anhielt und erst am dritten Tage schwand, von welchem Tage ab ein langsames Sinken der N-Ausscheidung täglich zu beobachten war. In dem nun folgenden Aufenthalt in der Ebene stieg die N-Ausscheidung wieder beträchtlich, und zwar war sie bedeutend höher als in den ersten Tagen des Bergaufenthaltes. Die zunächst gesteigerte N-Ausscheidung beim Aufenthalt auf dem Chasseral führten sie auf die Muskel-tätigkeit beim Besteigen des Berges zurück.

Ähnliche Ergebnisse wie beim Stickstoff fanden sie bei der Phosphorsäure. So betrug in der ersten Periode die Ausscheidung der täglichen Harn- P_2O_5 im Durchschnitt 4,249 g, während sie in der Zeit des Gebirgsaufenthaltes auf 3,572 g sinkt, um in der Nachperiode auf 4,005 g wieder anzusteigen.

In der Chlorausscheidung dagegen konnten sie eine analoge Gleichmäßigkeit nicht finden. Dieselbe wies während der ganzen Versuchszeit große Schwankungen auf. Im großen und ganzen aber war sie auf dem Berge stärker, als in der Ebene. Sie meinen, was die Chlorausscheidungen anbetrifft, daß der Hauptfaktor, welcher für dieselbe bestimmend zu sein scheint, die Menge des sezernierten Urins sei.

Was die Stickstoffausscheidung anbetrifft, war bereits Veraguth (12) zu ähnlichem Resultat gekommen.

Ferner haben Zuntz und Loewy (8) gemeinsam eingehende Untersuchungen über die Wirkungen des Höhenklimas auf den Stoffwechsel angestellt. Nachdem sie mehrere Versuchspersonen in N-Gleichgewicht gebracht hatten, setzten sie einige der Wirkung einer größeren Höhe aus. Speziell über den Einfluß der Höhenluft fanden sie schon in einer Höhe von 500 m eine deutliche Einwirkung auf den Eiweißumsatz, und zwar derart, daß in individuell schwankenden Grenzen eine deutliche Tendenz zum Eiweißansatz hervortritt.

Dasselbe Ergebnis betont Zuntz (9) in seinem Vortrag über „Die Physiologische Wirkung des Höhenklimas mit Rücksicht auf Vorbeugung und Behandlung der Tuberkulose“. Verminderter Sauerstoffgehalt der Luft, wie ihn das Höhenklima aufweist, führe zu einer Regeneration der Gewebe unter Ausschaltung des Minderwertigen. Diese Schädigung aber führe wieder zu einer kompensatorischen Regeneration, die nicht nur den Schaden repariert, vielmehr auch einen Überschuß resistenter Zellen schaffe. Als Symptom dieser Regeneration, d. h. also eines starken Anreizes zum Wachstum der Gewebe, beobachtet er im Stoffwechselversuch einen erheblichen Ansatz von Eiweiß. Zu dem gleichen Resultat

kommt G. von Wendt (10) bei seinen Versuchen in den Hochalpen. Er fand dabei die N-Bilanz stets positiv, während die Phosphorbilanz nur in einem Versuch positiv war, in einem zweiten sich der Gleichgewichtslage näherte und in den übrigen Versuchen negativ war. Er kommt zu dem Schlusse, daß die bei Stoffwechselversuchen in den Hochalpen beobachteten Stickstoffretentionen der Ausdruck einer Neubildung von lebender Substanz sei und nicht durch Retention von N in intermediären Verbindungen bedingt sei. Die mittleren Höhen haben eine verhältnismäßig hohe Wirkung auf die Hämoglobinbildung, während höhere Regionen, die die vorhergehende Hämoglobinbildung an einem etwas niedriger gelegenen Orte voraussetzen, einen stärkenden Einfluß auf das gesamte Muskelsystem ausüben.

Wir sehen also, daß einmal Jaquet und Staehelin bereits bei längerem Aufenthalt im Höheklime eine gewisse N-Retention verbunden mit P_2O_5 -Retention gefunden haben. Sodann heben Loewy und Zuntz hervor, daß Aufenthalt in Höhenluft einen Eiweißansatz bewirke, was Zuntz für sich bei seinen späteren Stoffwechselversuchen im Hochgebirge nochmals bestätigen konnte. Auf dieselbe Genauigkeit der Versuchsanordnung und der Untersuchungsmethoden, wie die der oben erwähnten Autoren kann die Arbeit von Wendt Anspruch erheben, der ebenfalls einen Albumenansatz bei Aufenthalt im Hochgebirge fand. Alle diese Autoren kommen demnach zu dem Endergebnis, daß beim Aufenthalt im Höhenklime ein Albumenansatz stattfindet.

Im Gegensatz hierzu nun haben die Versuche in der pneumatischen Kammer einen Albumenabbau ergeben.

Obwohl man sowohl bei den Versuchen in pneumatischen Kammern, wie im Höhenklime als hauptsächlich

wirkende Faktoren die Änderung der Sauerstoffspannung und des Gesamtdruckes in Betracht kommen, so scheint doch einerseits die verschiedene Stärke der Herabsetzung beider Faktoren einen wesentlich verschiedenen Einfluß auszuüben, wozu beim Höhenklima noch andere Einflüsse hinzuzukommen scheinen, wie Wind, Wärme und die Höhensonne. Teilweise nun nimmt man an, — Voraussetzung, daß die Verdünnung in der pneumatischen Kammer und Höhenklima einander entsprechen —, daß der erniedrigte Sauerstoffgehalt der Atmungsluft allein der wirkende Faktor sei, wie Loewy und Zuntz und Wendt sagen. Andererseits aber könnte man behaupten, daß die Änderung des Gesamtdruckes in gewissen Beziehungen zum Stoffwechsel stehe.

Da die Bedeutung dieser beiden Konponenten nur beurteilbar ist, wenn man einen ausschaltet, so lag der Gedanke nahe, Versuche über den Stoffwechsel anzustellen bei Herabsetzung des Sauerstoffpartialdruckes ohne Änderung des Gesamtdruckes. Um nun diese Untersuchungen anstellen zu können, bediente ich mich eines von Herrn Dr. David (11) konstruierten und als zuverlässig erprobten und mir von Herrn Geheimrat Professor Dr. Schmidt freundlichst zur Verfügung gestellten Apparates für Tierversuche, wie er in der Zeitschrift für Klinische Medizin Bd. 74, H. 5/6 beschrieben ist.

Die wesentlichen Bestandteile und Einrichtungen dieses Apparates sind folgende: Ein Blechkäfig ist durch eine Glasglocke, die in einem mit Paraff. liquid angefülltem Falz ruht, luffdicht abgeschlossen. Auf dem Boden des Käfigs befindet sich ein durchlöcherter Einsatz, Durch den Boden des Käfigs führen 4 Rohre, von denen eins Zuleitungsrohr für die gereinigte Luft und den Sauerstoff ist, eins als

Ableitungsrohr für die verbrauchte Luft dient, ein anderes zur Entnahme von Gasproben ist, das gleichzeitig in ein Gefäß mit Flüssigkeit taucht und so als Überdruckventil dient; das vierte Rohr endlich dient zum Ablassen des Harns. Ein luftdichter Ventilator entnimmt ständig durch das Ableitungsrohr einen gewissen Luftstrom, leitet denselben durch einen mit Stangen von Kalium kaustikum zwecks Absorption von CO_2 und Wasser, gefüllten Glaskolben, und drückt die so gereinigte Luft durch das Zuleitungsrohr in den Käfig zurück. Der verbrauchte Sauerstoff der Luft wird ständig durch O_2 , der aus einem Gasometer zufließt, ergänzt, und zwar so, daß der O_2 Gehalt der Luft im Käfig ständig der gleiche bleibt. Der Gasometer wieder wird aus einer Sauerstoffbombe nach Bedarf gefüllt. Der O_2 tritt durch ein Müllersches Ventil in das Zuleitungsrohr und von hier, vermischt mit der gereinigten, aber O_2 armen Luft aus dem Ventilator in den Kasten. Außerdem befand sich im Käfig ein von außen ablesbares Thermometer; durch eingeschaltete Kühlschlangen konnte die Temperatur nach Belieben reguliert werden. Um nun den zum Versuch gewünschten O_2 -Gehalt der Atmungsluft herzustellen, wenn es sich, wie in meinen Versuchen, um die Erniedrigung desselben handelt, läßt man zunächst N einströmen, bis die gewünschte Luftzusammensetzung erreicht ist. Die Untersuchung der Kastenluft wurde in der Weise angestellt, daß aus dem Rohr des Kastens, an dem sich das Überdruckventil befindet, eine Gasprobe entnommen wurde, die nach dem Verfahren der Hempelschen Gasanalyse untersucht wurde.

Was nun die einzelnen Versuche selbst anbetrifft, so habe ich als Versuchstiere Hunde von ungefähr derselben Größe und demselben Gewicht benutzt. Die Hunde wurden

vor Beginn des Versuches in Stickstoffgleichgewicht gebracht. Ferner befanden sich die Tiere auch an den Tagen, an welchen sie nicht der Kastenluft ausgesetzt waren, also an den Vor- und Nachversuchstagen, in einem Käfig, der ihnen nur wenig mehr Bewegungsfreiheit gestattete, als der Apparat selbst, damit die Tiere möglichst unter den gleichen Bedingungen standen wie im Kasten.

Die Nahrung der Tiere setzte sich hauptsächlich zusammen aus Pferdefleisch, Reis und Fett, wozu eine bestimmte Menge Chlornatrium und Aqua destillata kam. Der N, P_2O_5 und C_1 -Gehalt der Nahrung wurde jedesmal genau bestimmt. Diese Kost wurde, damit sie, vor allen Dingen das Fleisch, nicht ungenießbar wurde, in abgeteilten Portionen in einem sog. Weckschen Einkochapparat sterilisiert, und habe ich auf diese Weise erreicht, daß ich zu einzelnen Versuchen nur ein und dasselbe Fleisch von einem Pferd verwenden konnte.

Die Versuchshunde waren so gezogen, daß sie in einer bestimmten Zeit die Nahrung erhielten und auch verzehrten. Der jedesmalige, innerhalb von 24 Stunden gelassene Urin wurde gesammelt und außerdem die Tiere noch täglich katheterisiert. Da der Stuhl nicht immer innerhalb von 24 Stunden zu erhalten war, mußte ich den Stuhl der einzelnen Versuchsperioden zusammenfassen. Die Stühle unter sich, in den einzelnen Versuchsperioden, wurden durch Karmin abgegrenzt.

In meinen ganzen Versuchen habe ich Eiweiß und Zucker oder pathologische Bestandteile im Urin nicht gefunden.

Was die Urinuntersuchung anbetrifft, so wurde zunächst die jedesmalige Tagesmenge festgestellt, darauf das spezifische Gewicht und die Reaktion, die ständig sauer war.

Die Stickstoffbestimmungen wurden nach dem Verfahren von Kjeldahl vorgenommen. Zur Bestimmung der Phosphorsäure benutzte ich die Methode nach Neumann und zur Chlorbestimmung die von Vohlhard-Falck. Vom Stuhl wurde zunächst das Gewicht der Trockensubstanz festgestellt, danach der Stuhl pulverisiert. Die Bestimmung von N, P_2O_5 und Cl der Faeces wurden genau in derselben Weise vorgenommen, wie die des Urins.

Bei meinem ersten Versuch nun ließ ich den Versuchshund, nachdem er in Stickstoffgleichgewicht gebracht worden war, 3×24 Stunden im Versuchskasten atmen bei 20% O_2 im Durchschnitt, und dann 3×24 Stunden im Kasten bei 10% O_2 . Und zwar stellte ich den Versuch bei 20%, also bei annähernd normaler Zusammensetzung der Atmungsluft, deswegen an, um zu sehen, ob die veränderten Lebensbedingungen, worunter ich die verringerte Bewegungsfreiheit des Hundes hauptsächlich verstehe, einen Einfluß auf den Stoffwechsel ausüben. Laut Tabelle I änderte sich das Gewicht des Hundes an den Hauptversuchstagen im Vergleich zu den Vorversuchs- und Nachversuchstagen fast gar nicht. Die Menge des Urins zeigte geringe Unterschiede, indem sie von 440 ccm der Vorversuchstage in den Tagen bei einem Gehalt von 10% der Atmungsluft auf 370—390 ccm zurückgegangen, um am 2. Nachversuchstage auf 515 ccm zu steigen, Schwankungen, die m. E. nach ohne Bedeutung sind. Das spezifische Gewicht des Urins zeigte keine Schwankungen. Was die N-Ausscheidung im Urin anbetrifft, so sehen wir, daß an den Versuchstagen bei 20% O_2 der Atmungsluft eine ganz geringe Retention von N stattfand, die sich aber an den Tagen mit 10% O_2 der Atmungsluft noch vermehrte. In den Nachversuchstagen jedoch

fand wieder eine vermehrte Ausscheidung von N statt, die ungefähr dem an den Hauptversuchstagen retinierten N entspricht.

Die P_2O_5 -Ausscheidung im Urin dagegen blieb an den Hauptversuchstagen sowohl bei 20% O_2 als auch bei 10% O_2 im Vergleich zum Vorversuch unverändert, aber an den Nachversuchstagen sehen wir eine erhöhte Ausscheidung von P_2O_5 . Nicht dasselbe Resultat fanden wir in den Faeces. Zwar war auch hier an den ersten Hauptversuchstagen (bei 20% O_2) die N-Ausscheidung fast unverändert im Vergleich zu den Vorversuchstagen, jedoch bei 10% O_2 der Atmungs- luft stieg die N-Ausscheidung und nahm auch an den Nach- versuchstagen noch zu. Fast das gleiche Ergebnis hatte die P_2O_5 -Ausscheidung im Stuhl, nur das hier an den Nach- versuchstagen keine vermehrte Ausscheidung stattfand.

Stellt man nun die gesamte N-Ausscheidung (Urin und Stuhl) im Vergleich zur Nahrung (siehe Versuchstabellen im Anhang), so findet man auch hier, an den Hauptversuchs- tagen ein Plus von N, also eine Retention, während an den Nachversuchstagen eine vermehrte Ausgabe von N stattfindet. Die P_2O_5 -Ausscheidung war im großen und ganzen unverändert.

Das Ergebnis dieses Versuchs ist also, daß:

1. Aufenthalt in 20% O_2 keinen Einfluß auf den Stoff- wechsel hat,
2. in einer Atmungs- luft von durchschnittlich 10% O_2 - Gehalt eine Retention von N zutage tritt, und
3. der retinierte N an den Nachversuchstagen ausge- schieden wurde.

Demnach hat also der Aufenthalt in unserem Apparat bei annähernd normaler Zusammensetzung der Atmungs- luft

keinen wesentlichen Einfluß auf den Stoffwechsel des Hundes gehabt. Es bleibt daher als wirkender Faktor nur der veränderte O_2 -Gehalt der Atmungsluft.

Da ich nun bei Versuch I einen etwas niedrigeren O_2 -Gehalt der Atmungsluft genommen habe, so könnte man meinen, daß die vielleicht zu starke Herabsetzung des O_2 -Gehaltes eine gewisse Dyspnoe hervorgerufen habe und diese durch Mehrverbrauch an Kraft als solche störend auf den Stoffwechselumsatz eingewirkt habe. Um diese Frage nun zu klären, stellte ich bei Versuch II eine Erniedrigung des O_2 -Gehaltes der Atmungsluft bis auf ungefähr 13—15% her.

Auch hier sieht man, daß das Gewicht des Hundes sich wenig oder gar nicht verändert hat. Die Urinmengen sind nicht wesentlich verschieden bis auf den vierten Tag des Vorversuchs, wo die Urinmenge auf 680 ccm gestiegen war, um aber am nächsten Tage, dem ersten Hauptversuchstage, wieder abzufallen. Diese plötzliche vermehrte Urinausscheidung muß man auf eine gesteigerte Nierentätigkeit zurückführen, wie sie normaler Weise mitunter vorkommt. Außerdem aber zeigten das spezifische Gewicht und auch die Werte von N, P_2O_5 und Cl , daß es sich lediglich um eine Erhöhung der Urinmenge und nicht noch außerdem um eine erhöhte Konzentration des Urins handelte.

Bei der N-Ausscheidung des Urins sehen wir das gleiche Resultat wie in Versuch I. Es kommt auch hier wie in den Hauptversuchstagen zu einer N-Retention und einer vermehrten N-Ausscheidung an den Nachversuchstagen. Und ebenso zeigt die P_2O_5 -Bilanz an den Hauptversuchstagen eine Retention und an den Nachversuchstagen eine vermehrte Ausscheidung. Fast das gleiche Bild zeigen die Chlorauscheidungen des Urins.

Nicht ganz dasselbe Bild ergaben die Stuhluntersuchungen. Die N-Ausscheidungen desselben ergaben, prozentualiter eine geringe erhöhte Ausscheidung von etwa 0,3%, die aber an den Nachversuchstagen noch um 0,8% ungefähr stieg. Die P_2O_5 -Ausscheidung war an den Hauptversuchstagen prozentualiter erniedrigt und zeigte an den Nachversuchstagen geringe Erhöhung. Die Chlorausscheidung im Stuhl zeigte an den Hauptversuchstagen Retention und an den Nachversuchstagen erhöhte Ausscheidung, wie im Urin.

Wenn nun auch im Stuhl an den Hauptversuchstagen die N-Ausscheidung etwas erhöht war, als an den Vorversuchstagen, so genügt diese geringe Erhöhung in der N-Ausscheidung, die vielleicht durch Schlackenreste zu erklären ist, keineswegs, um das Resultat des Versuchs zu beeinflussen. Denn wir sehen, daß im Vergleich zu dem Nahrungs-N eine erhöhte N-Retention stattgefunden hat, da wir eine Mehr-Retention von 1,5 g N an den Hauptversuchstagen haben. Das gleiche Gesamtergebnis haben wir bei der P_2O_5 -Bilanz, während die C_1 -Retention fast gleich Null ist.

Das Ergebnis dieses zweiten Versuches ist also, daß bei einer Erniedrigung des Sauerstoffpartialdruckes auf 13—15% N und P_2O_5 im Körper zurückbehalten wird. Diese Retention läßt die Annahme zu, daß es sich um den Ansatz lebenden Gewebes handelte und nicht um die Zurückbehaltung N- und P_2O_5 reicher Stoffe, da in diesem Falle sicherlich in den folgenden Tagen eine erhöhte Ausfuhr eingetreten wäre.

Um nun zu sehen, welche Einwirkung auf den Stoffwechsel eine Erniedrigung des O_2 -Partialdruckes hat, wenn man die Versuchstiere nur eine gewisse Stundenzahl der Atmungsluft mit niedrigem O_2 -Gehalt aussetzt, machte ich die Versuche III und IV.

Bei Versuch III nun ließ ich den Hund an 2 Tagen je 12 h. bei 10% O_2 im Kasten atmen und fand hier zunächst an den Hauptversuchstagen und an den Nachversuchstagen ein erhöhtes spezifisches Gewicht und zeitweise eine Erniedrigung der Urinmenge, was also auf eine erhöhte Konzentration des Urins schließen läßt.

Aber auch hier sah ich im Durchschnitt im Urin an den Hauptversuchstagen eine geringe N-Retention, während die P_2O_5 -Ausscheidung fast unverändert blieb, aber an den Nachversuchstagen niedriger wurde. In der Chlorausscheidung fand ich eine Retention, aber keine vermehrte Abgabe von C_1 an den Nachversuchstagen.

Anders das Ergebnis der Stuhlanalyse. Eine vermehrte N-Ausscheidung an den Hauptversuchstagen, während die P_2O_5 -Ausscheidungen eine gewisse Retention an den Hauptversuchstagen mit erhöhter Ausscheidung an den Nachversuchstagen ergaben. Die C_1 -Ausscheidungen dagegen sind sehr schwankend.

Die Ausscheidungsbilanz nun im Vergleich zu der Nahrung ergibt keine erhöhte N-Retention, während die P_2O_5 - und C_1 -Bilanz eine Retention zeigen. Als Grund für diese abweichenden und schwankenden Ergebnisse nehme ich eine bestehende Gravidität des Hundes an, die aber leider erst nach Beendigung des Versuchs erkannt wurde.

In meinem letzten (IV.) Versuch war der Hund an vier aufeinander folgenden Tagen je 4 h. einer Atmungsluft von 8% O_2 ausgesetzt; nun stieg am zweiten Vorversuchstage die Urinmenge auf 940 ccm an, das spezifische Gewicht jedoch war nicht erhöht. An den übrigen Tagen waren die Werte für Urinmenge wieder zur Norm zurückgekehrt. Das spezifische Gewicht zeigte sich im großen und ganzen nicht verändert.

Auch zeigte die N-Ausscheidung im Urin an den Hauptversuchstagen wieder Retention von N, während an den Nachversuchstagen eine entsprechend erhöhte N-Abgabe stattfand. Zu dem gleichen Ergebnis führten die P_2O_5 und C_1 -Ausscheidungen des Urins. Auch im Stuhl ließ sich eine geringe N-Retention nachweisen, jedoch ohne vermehrte Ausscheidung an den Nachversuchstagen. Bei Berechnung der Durchschnittsausscheidung von N im Stuhl kommt man allerdings auch hier zu einer vermehrten Ausscheidung von N an den Nachversuchstagen.

Ebenso fand ich, was P_2O_5 - und C_1 -Ausscheidung anbetrifft, auch hier an den Hauptversuchstagen eine Retention und vermehrte Ausscheidung an den Nachversuchstagen.

Bei der Bilanzberechnung nun ergibt sich, daß an den Hauptversuchstagen eine beträchtliche N-Retention stattgefunden, und zwar in dem Maße, daß die N-Ausscheidung bei einem Minus von 0,54 g auf + 2,54 g an den Hauptversuchstagen im Durchschnitt ansteigt, um an den Nachversuchstagen auf + 2,0 g abzufallen. Immerhin aber zeigen die Nachversuchstage noch ein bedeutendes Plus von N-Retention im Vergleich zu den Vorversuchstagen.

Auch die Bilanz für P_2O_5 und C_1 ergab an den Hauptversuchstagen ein bedeutenes Plus an Retention, das auch hier sich auf die Tage des Nachversuchs erstreckte.

Wir sehen auch an Versuch IV wieder, wie in Versuch II, eine Retention¹ von N und P_2O_5 und von C_1 . Es ist also hier wahrscheinlich zu einem Albumenansatz in den Tagen des Versuchs gekommen.

Versuch	Stunden pro die im Versuchskasten	%-Gehalt an O ₂ der Atmungs-luft	Ergebnis der N-Untersuchungen	Ergebnis der P ₂ O ₅ -Untersuchungen	Ergebnis der Cl-Untersuchungen	Gesamtergebnis
I	24 h.	10%	An den Hauptversuchstagen N-Retention, an den Nachversuchstagen vermehrte N-Ausscheidung	Auch an den Haupt- und Nachversuchstagen keine Unterschiede	Keine Retention an den Hauptvers.-Tag. Keine Mehrausgabe an den Nachversuchstagen	Kein Albumenansatz an den Hauptversuchstagen, nur N-Retention, der aber nicht gebunden erscheint. Keine Änderung in der P ₂ O ₅ -Ausscheidung
II	24 h.	13—15%	Wie in I	Retention von P ₂ O ₅ an den Hauptvers.-Tag. und vermehrte Ausscheidung an den Nachversuchstagen	Retention an den Hauptvers.-Tag. Keine Mehrausgabe an den Nachversuchstagen	Albumenansatz an den Hauptversuchstage. An den Nachversuchstag. Ausscheidung des retinierten N und P ₂ O ₅
III	12 h.	10%	Keine Retention von N an Haupt- und Nachversuchstagen	Geringe Retention von P ₂ O ₅ an Haupt- und Nachvers.-Tag.	Retention von Cl an Haupt- und Nachversuchstagen	Das abweichende Ergebnis ist durch eine Gravidiät des Hundes zu erklären, weswegen dieser Versuch bei der Beurteilung nicht in Betracht zu ziehen sein dürfte
IV	4 h.	8%	Wie in I und II, mit dem Unterschied, daß sich die Retention von N auch auf die Nachversuchstage erstreckte	Retention von P ₂ O ₅ an Haupt- und Nachversuchstagen	Retention von Cl an den Haupt- und Nachversuchstagen	Albumenansatz an den Hauptvers.-Tag., der auch an den Tagen des Nachversuchs anhält

An Hand vorstehender Tabelle ist ersichtlich, wenn ich Versuch III bei der Beurteilung wegen der durch die Gravidität bedingten abweichenden Ergebnisse unberücksichtigt lasse, daß während eines Aufenthaltes von 24 h. bei einer Erniedrigung des O_2 -Partialdruckes auf 10% (Versuch I) eine N-Retention stattfindet, die P_2O_5 -Ausscheidung aber nicht wesentlich geändert wird. Es muß sich demnach nur um eine N-Retention gehandelt haben, nicht um einen Eiweißanbau.

Dagegen fand ich bei 24 stündigem Aufenthalt bei einem auf 13 — 15% herabgesetzten Sauerstoffpartialdruck (Versuch II) eine N- und P_2O_5 -Retention an den Hauptversuchstagen und keine wesentliche Änderung in der C_1 -Ausscheidung. Also hat während des Aufenthaltes im Kasten ein Albumenansatz stattgefunden. Aber an den Nachversuchstagen fand ich wieder eine vermehrte Ausscheidung von N und P_2O_5 , während die C_1 -Ausscheidungen auch hier keine Mehrausgabe aufwiesen.

Bei einem 4 h. Aufenthalt bei auf 8% herabgesetztem Sauerstoffgehalt der Atmungsluft ergaben die Untersuchungen an den Hauptversuchstagen eine Retention von N, P_2O_5 und C_1 . Es ist also auch hier wahrscheinlich zu einem Albumenansatz gekommen. Doch zeigen hier die Ergebnisse der Nachversuchstage, daß der Albumenansatz auch an denselben anhält, da nicht, wie in Versuch I und II, die vermehrte N- und P_2O_5 -Ausscheidung eintritt.

Wodurch nun kann man sich diese Differenzen erklären?

Einmal meine ich, daß besonders in Versuch I die lange Dauer des Aufenthaltes in dem fast gar keine Bewegungen gestattenden Apparat einen Einfluß auf den Stoffwechsel hervorgerufen haben kann, und daß zweitens der

mehrere Tage dauernde Aufenthalt bei dem herabgesetzten O_2 -Partialdruck, sowohl in Versuch I wie in Versuch II, Störungen im Oxydationsprozeß der Gewebe und damit im Stoffwechsel-Kreislauf hervorgerufen hat. Andererseits aber zeigt der Versuch IV, daß ein Aufenthalt von nur wenigen Stunden bei stark herabgesetztem O_2 -Partialdruck eine anhaltende Wirkung hat. Letzteres entspricht der Beobachtung, daß auch die Erythrocyten in dieser Weise zu einer dauernden Vermehrung gebracht werden können.

Das Gesamtergebnis meiner Untersuchungen ist, daß

1. allein die Erniedrigung des Sauerstoff-Partialdruckes genügt, um eine Änderung im Stoffwechsel hervorzurufen, und daß
 2. lang andauernder Aufenthalt in dieser Atmungsluft zwar eine gewisse N-Retention bewirkt, die aber nur während des Aufenthaltes unter diesen veränderten Lebensbedingungen anhält, während dagegen
 3. ein Aufenthalt von wenigen Stunden am Tage in O_2 -armer Luft eine Anregung auf den Stoffwechsel hervorruft, derart, daß ein Albumenansatz nicht nur während der Versuchstage stattfindet, sondern auch über dieselben hinaus.
-

Anhang.

(Tabellen.)

Resultat:

Tag	N-Ausscheidung im Durchschnitt pro die von Urin + Stuhl	P ₂ O ₅ -Ausscheidung im Durchschnitt pro die von Stuhl + Urin	Netto: N pro die:	N-Ansatz pro die:	Netto: P ₂ O ₅ pro die:	P ₂ O ₅ -Ansatz pro die:
19. V. bis 20. V.	5,589	1,141	5,586	+ 0,355	2,109	+ 1,287
21. V. bis 23. V.	5,293	1,141	5,627	+ 0,671	2,156	+ 1,287
24. V. bis 26. V.	5,418	1,262	5,387	+ 0,546	1,9947	+ 1,166
27. V. bis 29. V.	6,442	1,259	5,397	— 0,363	2,1687	+ 0,908

Nahrung:

täglich: 150 g Pferdefleisch, 50 g Reis, 25 g Fett,
3 g Kochsalz, 300 ccm Aqua destil.

Da für die letzten 3 Versuchstage das Pferdefleisch
nicht ausreichte und das zweite Pferdefleisch anderen
Gehalt an N und P₂ O₅ aufwies, war in der Nahrung ent-
halten wie folgt:

Tag	N	P ₂ O ₅
19. V. bis 26. V.	5,964	2,427
27. V. bis 29. V.	6,069	2,561

Versuch II.

Tag	Gewicht des Hundes g	Urin: Menge in ccm	Urin: spezif. Gewicht	Urin: N (gesamt)	Urin: N in %	Urin: P ₂ O ₅ (gesamt)	Urin: P ₂ O ₅ in %	Urin: Cl (gesamt)	Urin: Cl in %	Urin: N-Ausscheidung im Durchschnitt pro die:	Urin: P ₂ O ₅ -Aus- scheidung im Durch- schnitt pro die:
7. IV. bis 8. IV. 1912	6200	283	1024	2,504	0,8848	0,45	0,159	0,263	0,092	4,136	0,717
8. IV. bis 9. IV.	6200	254	1028	3,855	1,5177	0,447	0,184	0,235	0,0925		
9. IV. bis 10. IV.	6150	226	1025	2,189	0,968	0,506	0,223	0,228	0,0857		
10. IV. bis 11. IV.	6200	680	1027	7,997	1,176	1,466	0,256	0,716	0,1053	3,605	0,468
11. IV. bis 12. IV.	6100	205	1037	4,523	2,206	0,403	0,197	0,21	0,1024		
12. IV. bis 13. IV.	6000	420	1027	2,687	0,639	0,533	0,1269	0,406	0,0966		
13. IV. bis 14. IV.	6000	320	1030	3,976	1,242	0,582	0,182	0,381	0,119	4,564	0,668
14. IV. bis 15. IV.	6050	320	1035	5,152	1,61	0,753	0,2353	0,336	0,1031		

Resultat:

Tag	N-Ausscheidung im Durchschnitt pro die an Urin + Stuhl	P ₂ O ₅ -Ausscheidung im Durchschnitt pro die an Urin + Stuhl	C ₁ -Ausscheidung im Durchschnitt pro die an Urin + Stuhl	Netto: N pro die:	N-Ansatz pro die:	Netto: P ₂ O ₅ pro die:	P ₂ O ₅ -Ansatz pro die:	Netto: C ₁ pro die:	C ₁ -Ansatz pro die:
7./8. IV. bis 10./11. IV.	4,515	0,826	0,452	7,059	+ 2,924	1,6335	+ 0,9165	3,2467	+ 2,8817
11./12. IV. bis 12./13. IV.	3,95	0,505	0,339	7,094	+ 3,488	1,7055	+ 1,2375	3,3017	+ 2,9937
13./14. IV. bis 14./15. IV.	4,862	2,706	0,402	7,141	+ 2,672	1,7045	+ 1,1365	3,2707	+ 2,9117

Nahrung:

täglich: 150 g Pferdefleisch, 25 g Reis, 15 g Fett,
3 g Kochsalz, 300 ccm Aqua destil.

In der täglichen Nahrung war enthalten:

an N = 7,439 g, an P₂O₅ = 1,7425 g, an C₁ = 3,3337 g.

Resultat: Versuch III.

Tag	N-Ausscheidung im Durchschnitt pro die von Urin + Stuhl	P ₂ O ₅ -Ausscheidung im Durchschnitt pro die von Urin + Stuhl	C ₁ -Ausscheidung im Durchschnitt pro die von Urin + Stuhl	Netto: N	N-Ansatz	Netto-P ₂ O ₅	P ₂ O ₅ -Ansatz	Netto: C ₁	C ₁ -Ansatz
11. VI. bis 14. VI.	5,8747	1,1362	2,83526	7,359	+ 1,841	1,3086	+ 0,3888	4,2839	+ 1,5351
15. VI. bis 16. VI.	6,71507	1,1239	2,18995	6,293	+ 1,001	1,32718	+ 0,40104	4,0233	+ 2,18049
17. VI. bis 18. VI.	6,5295	0,9318	1,90439	7,46	+ 1,1862	1,38058	+ 0,59316	4,30388	+ 2,466

Versuch IV.

19. VI. bis 20. VI.	8,2915	1,4769	4,59849	7,46	— 0,5758	1,38058	+ 0,04905	4,30388	+ 0,2279
21. VI. bis 24. VI.	6,8980	0,8580	2,4476	9,252	+ 2,547	1,21659	+ 0,39308	4,2989	+ 1,9228
25. VI. bis 26. VI.	7,4024	1,1819	3,25588	9,188	+ 2,045	1,21535	+ 0,07526	4,2963	+ 1,11456

Nahrung:

Vom 11. bis 20. VI. täglich: 200g Pferdefleisch, 25g Reis, 50g Fett, 4g Kochsalz, 300 ccm Aqua destil.

Vom 21. bis 26. VI. täglich: 250g Pferdefleisch, 15g Reis, 50g Fett, 4g Kochsalz, 300 ccm Aqua destil.

In der täglichen Nahrung war enthalten:

Tag	N	P ₂ O ₅	C ₁
11. VI. bis 20. VI.	7,7157	1,525	4,37045
21. VI. bis 26. VI.	9,4467	1,2512	4,33625

(Siehe Tabellen S. 30 und 31.)

Versuch II

Tag	Urin: Menge in ccm	Urin: spezif. Gewicht	Urin: N (gesamt)	Urin: N in %	Urin: P ₂ O ₅ (gesamt)	Urin: P ₂ O ₅ in %	Urin: Cl (gesamt)	Urin: N-Ausscheidung im Durchschnitt pro die:	Urin: P ₂ O ₅ -Aus- scheidung im Durch- schnitt pro die:	Urin: Cl -Ausscheidung im Durchschnitt pro die:	Urin: Cl in %
ccm				%		%					%
11. VI. 1912	400	1011 ¹ / ₂	1,534	0,384	0,420048	0,105012	2,0164				0,504
12. VI.	340	1017	2,706	0,796	0,601181	0,1768	2,24502	5,5178	0,91985	2,748735	0,660
13. VI.	600	1019	11,584	1,931	1,213476	0,20207	3,5784				0,596
14. VI.	520	1021	6,246	1,201	1,444695	0,2778	3,17512				0,610
15. VI.	303	1030	5,175	1,707	0,666594	0,21999	1,355319				0,477
16. VI.	438	1027	5,408	1,234	1,005245	0,2295	2,33235	5,2918	0,926135	1,843835	0,539
17. VI.	200	1039	6,165	3,802	0,847024	0,42301	0,852				0,426
18. VI.	410	1032	6,382	1,556	0,727832	0,17752	2,82367	6,274	0,787428	1,837835	0,688

Versuch IV

19. VI.	720	1024	6,492	0,901	0,91296	0,1268	4,19184	8,036	1,33254	4,53193	0,5822
20. VI.	940	1020	9,580	1,019	1,75212	0,1864	4,87202				0,5187
21. VI.	545	1027	8,805	1,615	1,216265	0,22316	3,48155				0,639
22. VI.	300	1030	5,342	1,78	0,5725	0,1908	2,0235	6,705	0,823499	2,41037	0,6745
23. VI.	335	1032	6,172	1,842	0,798586	0,2383	2,331462				0,69595
24. VI.	450	1029	6,502	1,445	0,706644	0,157	1,805075				0,40115
25. VI.	490	1030	7,007	1,43	1,224	0,2498	3,16589	7,143	1,146	3,215945	0,6461
26. VI.	500	1028	7,28	1,456	1,068	0,2136	3,266				0,6532

Stuhl: Gewicht der Trokensubstanz	Stuhl: N (gesamt)	Stuhl: N in %	Stuhl: P_2O_5 (gesamt)	Stuhl: P_2O_5 in %	Stuhl: C_1 (gesamt)	Stuhl: C_1 in %	Stuhl: N-Ausscheidung im Durchschnitt pro die:	Stuhl: P_2O_5 -Ausscheidung im Durchschnitt pro die:	Stuhl: C_1 -Ausscheidung im Durchschnitt pro die:	
39	1,42782	5,661	0,86541	2,219	0,346125	0,8875	0,356955	0,21635	0,086531	Vorversuch
52	2,84648	5,474	0,39561	0,761	0,69225	1,331	1,4234	0,197825	0,346155	12h. bei 10% Sauerstoff im Kasten
25	1,022	4,088	0,533425	2,1337	0,26625	1,065	0,2555	0,1444125	0,066562	Nachversuch

25	1,022	4,088	0,533425	2,1337	0,26625	1,065	0,2555	0,1444125	0,066562	Vorversuch
12	0,7819	6,515	0,138465	1,1538	0,1491	1,2425	0,19548	0,034616	0,037275	4 h. bei 8% Sauerstoff im Kasten
9	0,51786	5,754	0,0718956	0,79884	0,079875	0,8895	0,25893	0,035947	0,399375	Nachversuch

Literaturverzeichnis.

1. Bert, P.: La Pression barométrique. Paris 1878.
2. Fraenkel, A. und Geppert, J.: Über die Wirkungen der verdünnten Luft auf den Organismus. Berlin 1884.
3. Hermann: Handbuch der Physiologie, Bd. 6.
4. Wohlgemuth, L.: Seltene Störungen im Eiweißstoffwechsel.
5. Kronecker, H.: Die Bergkrankheit. Berlin-Wien 1903. (Deutsche Klinik im Eingang des 20. Jahrhunderts).
6. Mosso, A.: Der Mensch auf den Hochalpen. Leipzig 1899.
7. Jaquet und Staehelin: Stoffwechselversuche im Hochgebirge. (Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, Bd. 46. 1901).
8. Zuntz, N., Loewy, A., Müller-Caspary: Höhenklima und Bergwanderungen in ihrer Wirkung auf den Menschen. Berlin 1906.
9. Zuntz, N.: Die Physiologische Wirkung des Höhenklimas mit Rücksicht auf Vorbeugung und Behandlung der Tuberkulose. (Internat. Tuberkulose - Kongreß 1908. Bd. I, 2).

10. Wendt, G. von: Über den Einfluß des Höhenklimas auf den Stoffwechsel des Menschen. (Skandinav. Archiv für Physiologie 1910. Bd. 24).
 11. David: Zeitschrift für Klin. Mediz. Bd. 74 H. 5/6.
 12. Veraguth: Le climat de la Haut-Engadin et son action physiologique. (Thèse de Paris 1887, pag. 103).
 13. Oppenheim: Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Harnstoffausscheidung. Pflügers Archiv Bd. 23, pag. 446.
-

Lebenslauf.

Ich, Karl Georg Martin Bache wurde am 23. September 1886 zu Kottbus als zweiter Sohn des Rektors Otto Bache geboren. Ich bin evangelischer Konfession und Preuße. Meine Schulbildung genoß ich am Kgl. Friedrich Wilhelms-Gymnasium zu Kottbus, das ich bis zur Reifeprüfung, 1906, besuchte. Ostern 1906 bezog ich die Universität Tübingen, um mich dem Studium der Medizin zu widmen. Ostern 1907 siedelte ich nach der Universität Halle a. S. über, wo ich im August 1909 das Physikum bestand. Ich studierte dann weiter in Halle und bestand hier Anfang des Jahres 1912 das ärztliche Staatsexamen. Als Medizinalpraktikant war ich tätig teilweise an der Kgl. Medizinischen Universitäts-Klinik zu Halle a. S. (Leiter: Herr Geh. Medizinal-Rat Prof. Dr. Ad. Schmidt) und teilweise an der chirurgischen Abteilung des Evangel. Krankenhauses zu Köln (Leiter: Herr Prof. Dr. E. Martin).

Seit April 1913 bin ich am Salvator-Krankenhaus zu Halberstadt (Leiter: Herr Oberarzt Dr. Springorum) tätig.

Meine Approbation als Arzt datiert vom 9. April 1913. Das Colloquium fand am 31. Juli 1913 statt.

Als meine Lehrer verehere ich die Herren:
in Tübingen:

Geh. Medizinal-Rat Prof. Dr. Froriep und Prof. Dr. Heidenhain;

in Halle:

die Herren Geh. Medizinal-Rat Prof. Dr. Anton, von
Bramann†, Bernstein, Eberth, Fraenken, Gre-
nacher, Harnack, Roux, Schmidt, Veit, Volhardt
und die Herren Prof. Dr. Beneke, Frese, Gebhardt,
von Hippel, Isemer, Mohr und Stieda.

Zum Schluß sei es mir auch an dieser Stelle gestattet
Herrn Geh. Medizinal-Rat Prof. Dr. Ad. Schmidt und Herrn
Dr. med. David, Assistenzarzt der Kgl. Medizinischen Klinik
zu Halle a. S., für die freundliche Anregung zu dieser Arbeit
und für die liebenswürdige Beratung bei ihrer Ausführung
meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

1870
The first of the year was a very
cold one, and the weather was
very disagreeable. The wind was
very strong, and the rain was
very heavy. The snow was very
deep, and the ice was very
thick. The people were very
suffering, and the animals were
very starved.

The second of the year was a
very warm one, and the weather
was very pleasant. The wind
was very light, and the rain
was very light. The snow was
very thin, and the ice was very
thin. The people were very
happy, and the animals were
very fat.